

EUFORA

Culture et indications sur la variété

Type de variété	deux rangs
Facteurs de rendement	
• Peuplement optimal épis/m ²	+
• Nombre de grains/épi	+
• PMG	+
Rendement grains	
• PER	+ (+)
• Extenso	+
Culture Extenso	bien adapté
Epoque / densité de semis grains/m²	
• précoce	250-300
• optimale	300-350
• tardive	350-375
Maturité	mi-tardive
Hauteur	moyenne à courte
Résistance à la verse	+
Poids à l'hectolitre	++
Indice PUFA MUFA (IPM)	
Résistance aux maladies	
• Oïdium	++
• Helminthosporiose	+
• Rhynchosporiose	++
• Mosaïque jaune	sensible
• Jaunisse nanisante de l'orge	++
Fumure azotée	
→ Règle générale: La fumure N doit être adaptée aux réserves du sol, à l'emplacement, au rendement visé et aux conditions météorologiques.	
La fumure azotée est basée sur un peuplement moyen à élevé. Le 1 ^{er} apport permet d'influencer le peuplement. Fractionnement possible: 1 ^{er} apport au départ de la végétation 40%, 2 ^{ème} apport début montaison 30%, 3 ^{ème} apport apparition dernière feuille 30%.	
Régulateur de croissance (en culture intensive)	
• Dosage	faible