

FIORINA

Sommerweizen Klasse Top

Anbau- und Sortenhinweise für Herbstsaaten

Sortentyp	Kompensations Typ
Ertragsfaktoren	
• Zielbestand Ähren/m ²	Ø mittel
• Kornzahl/Ähre	+ mittel bis hoch
• TKG	+ + hoch
Bestockung	mittel
Körnerertrag	
• Extenso	+
Extenso – Anbau	geeignet
Saatzeit / Saatlücke Körner/m²	
• Früh	400
• Optimal	450
• Spät	500
Spätsaaten	bedingt geeignet
Winterhärte	mittel
Reife beim Ährenschieben / Ernte	mittelfrüh
Pflanzenlänge	mittelkurz
Standfestigkeit	+ +
Auswuchsrisiko	+
Krankheitsresistenzen	
• Mehltau	+
• Braunrost	+
• Spelzenbräune Blatt	Ø
• Spelzenbräune Ähre	Ø
• Septoria tritici	Ø
• Fusarien	+

Stickstoffdüngung

→ **Grundsätzlich gilt:** Die N-Düngung sollte an Bodenvorräte, Standort, Ertragsziel und den Witterungsverhältnissen angepasst werden.

Komp.-Typ

Die Startdüngung hängt von der Bestandesentwicklung im Frühjahr ab. Die 2. Gabe sollte in gut bestockte Bestände nicht zu früh erfolgen. Vor allem bei Sorten mit hoher Kornzahl/Ähre. Mit der 3. Gabe das TKG absichern.

Wachstumsregulator (im Intensivanbau)

- Aufwandmenge mittel