

FOREL

Blé d'automne classe I

Culture et indications sur la variété

Type de variété	type de compensation	
Facteurs de rendement		
• Peuplement optimal épis/m ²	+	moyen à fort
• Nombre de grains/épi	+	moyen à fort
• PMG	∅	faible
Tallage	++	
Rendement grains		
• PER	+	
• Extenso	+	
Culture Extenso	adapté	
Epoque / densité de semis grains/m²		
• précoce	325-375	
• optimale	375-425	
• tardive	425-475	
Semis tardifs		
Résistance à l'hiver	++	
Maturité	précoce	
Hauteur	moyenne	
Résistance à la verse	+++	
Risque de germination	+(+)	
Résistance aux maladies		
• Oïdium	+	
• Rouille brune	-	
• Septoriose feuilles	∅	
• Septoriose épis	+	
• Septoria tritici	∅	
• Fusariose	∅	
Fumure azotée		
→ Règle générale: La fumure N devrait être adaptée aux réserves du sol, à l'emplacement, au rendement visé et aux conditions météorologiques.		
Type dit de compensation		
La fumure de départ dépend du peuplement au printemps. Le 2e apport ne devrait pas se faire trop tôt dans un bon peuplement (surtout dans des variétés au nombre élevé de grains par épi). Assurer le PMG par un 3 ^e apport.		
Régulateur de croissance (en culture intensive)		
• Dosage	moyen	