

L A V E R D A

Anbau- und Sortenhinweise

Sortentyp	mehrzeilig	
Ertragsfaktoren		
• Zielbestand Ähren/m ²	∅	mittel
• Kornzahl/Ähre	+ +	hoch
• TKG	∅	mittel
Körnerertrag		
• ÖLN	+	
• Extenso	+	
Extenso – Anbau	gut geeignet	
Saatzeit / Saatlänge Körner/m²		
• Früh	225 - 250	
• Optimal	250 - 275	
• Spät	275 - 325	
Reife	mittelfrüh	
Pflanzenlänge	mittel	
Standfestigkeit	+	
Ährenknicken	gering	
Hektolitergewicht	- -	
PUFA MUFA Index	tief bis mittel	
Krankheitsresistenzen		
• Mehltau	+ +	
• Netzflecken	+	
• Blattflecken	+ +	
• Gelbmosaik	resistent	
• Gelbverzweigungs Virus	-	
Stickstoffdüngung		
→ Grundsätzlich gilt: Die N-Düngung sollte an Bodenvorräte, Standort, Ertragsziel und den Witterungsverhältnissen angepasst werden.		
Die N-Düngung der mehrzeiligen Typen erfolgt schossbetont. Mögliche Aufteilung der Gaben: 1. Gabe bei Vegetationsbeginn 30%, 2. Gabe Anfang Schossen 40%, 3. Gabe bei Beginn Fahnenblattschieben 30%.		
Wachstumsregulator (im Intensivanbau)		
• Aufwandmenge	mittel	

++++ ausgezeichnet +++ sehr gut ++ gut + mittel bis gut ∅ mittel - mittel bis schlecht
 -- schlecht --- sehr schlecht