

LEONORE

Culture et indications sur la variété

Type de variété	six rangs
Facteurs de rendement	
• Peuplement optimal épis/m ²	+
• Nombre de grains/épi	+
• PMG	+
Rendement grains	
• PER	++
• Extenso	++
Culture Extenso	
Epoque / densité de semis grains/m²	
• précoce	225-250
• optimale	250-275
• tardive	275-325
Maturité	mi-tardive
Hauteur	courte
Résistance à la verse	+
Pois à l'hectolitre	∅
Indice PUFA MUFA (IPM)	bas à moyen
Résistance aux maladies	
• Oïdium	∅
• Helminthosporiose	∅
• Rhynchosporiose	-
• Mosaïque jaune	sensible
• Jaunisse nanisante de l'orge	
Stickstoffdüngung	
→ Règle générale: La fumure N doit être adaptée aux réserves du sol, à l'emplacement, au rendement visé et aux conditions météorologiques.	
La fumure azotée des variétés à six rangs est accentuée sur la montaison. Fractionnement possible: 1 ^{er} apport début végétation 30%, 2 ^{ème} apport début montaison 40%, 3 ^{ème} apport apparition dernière feuille 30%	
Régulateur de croissance (en culture intensive)	
• Dosage	bas