

LEONORE

Anbau- und Sortenhinweise

Sortentyp

Ertragsfaktoren

- Zielbestand Ähren/m² +
- Kornzahl/Ähre +
- TKG +

Körnerertrag

- ÖLN ++
- Extenso ++

Extenso – Anbau

Saatzeit / Saattiefe Körner/m²

- Früh 225-250
- Optimal 250-275
- Spät 275-325

Reife mittelspät

Pflanzenlänge kurz

Standfestigkeit +

Ährenknicken

Hektolitergewicht Ø

PUFA MUFA Index tief-mittel

Krankheitsresistenzen

- Mehltau Ø
- Netzflecken Ø
- Blattflecken –
- Gelbmosaik anfällig
- Gelbverzweigungs Virus

Stickstoffdüngung

→ **Grundsätzlich gilt:** Die N-Düngung sollte an Bodenvorräte, Standort, Ertragsziel und den Witterungsverhältnissen angepasst werden.

Die N-Düngung zielt auf einen mittel bis hohen Bestand ab. Mit der 1. Gabe müssen zu dünne oder zu dichte Bestände korrigiert werden. Eine mögliche Aufteilung der Gaben: 1. Gabe bei Vegetationsbeginn 40%, 2. Gabe bei Beginn des Schossens 30%, 3. Gabe bei Beginn Fahnenblattschieben 30%.

Wachstumsregulator (im Intensivanbau)

- Aufwandmenge tief