

# Rubli

Sommerweizen Klasse Top

## Anbau- und Sortenhinweise für Frühlingssaaten

Sortentyp	Einzelärenertags-Typ
<b>Ertragsfaktoren</b>	
• Zielbestand Ähren/m <sup>2</sup>	∅ mittel
• Kornzahl/Ähre	+ mittel bis hoch
• TKG	∅ mittel
<b>Bestockung</b>	mittel
<b>Körnerertrag</b>	
• Extenso	+
<b>Extenso – Anbau</b>	geeignet
<b>Saatzeit / Saatlänge Körner/m<sup>2</sup></b>	
• Früh	400
• Optimal	450
• Spät	500
<b>Reife</b>	früh
<b>Pflanzenlänge</b>	mittel
<b>Standfestigkeit</b>	+ +
<b>Auswuchsrisiko</b>	+
<b>Krankheitsresistenzen</b>	
• Mehltau	∅
• Braunrost	-
• Spelzenbräune Blatt	+
• Spelzenbräune Ähre	∅
• Septoria tritici	∅
• Fusarien	∅
<b>Stickstoffdüngung</b>	
→ <b>Grundsätzlich gilt:</b> Die N-Düngung sollte an Bodenvorräte, Standort, Ertragsziel und den Witterungsverhältnissen angepasst werden.	
Die N-Düngung zielt auf einen mittel bis hohen Bestand ab. Eine mögliche Aufteilung der Gaben: 1. Gabe zum Auflaufen, 2. Gabe bei Beginn des Schossens , 3. Gabe bei Beginn Fahnenblattschieben.	
<b>Wachstumsregulator</b> (im Intensivanbau)	
• Aufwandmenge	mittel

++++ ausgezeichnet    +++ sehr gut    ++ gut    + mittel bis gut    ∅ mittel    - mittel bis schlecht    -- schlecht    --- sehr schlecht