



Liste der empfohlenen Sommerweizensorten für die Ernte 2010

Klasse	Top		I		
	FIORINA*	CARASSO*	TROVAT ①	CH CAMPALA ①	CH RUBLI
Aufnahmejahr	2001	2005	2009 (provisorisch)	2009 (provisorisch)	2007
Ertrag (Extenso)	++	+	+	++++	+++
Frühreife/Aehrenschieben	mf	s	mf	sf	f
Pflanzenhöhe	mk	m	m	m	m
Standfestigkeit	++	++	+	++	++
Resistenz	Mehltau	++	+++	++	++
	Gelbrost	+++	++	∅	∅
	Braunrost	∅	∅	++	∅
	<i>Septoria nodorum</i> Blatt	∅	+	+	∅
	<i>Septoria nodorum</i> Ähre	∅	∅	∅	∅
	<i>Septoria tritici</i> Blatt	∅	∅	+	∅
	Fusarien Aehre	∅	∅	+	∅
	Auswuchs	+	∅	+	∅
Proteingehalt	++	++	+++	++	++
Zeleny	+	+	++	+	+
Hektolitergewicht	∅	++	-	+	+++
Tausendkorngewicht	mittel	mittel	klein	mittel	klein

Obige Sortenbeschreibung basiert auf zwei- bis dreijährigen Durchschnittsergebnissen aus dem Versuchsnetz von Agroscope ACW-ART. Diese Angaben können in Abhängigkeit vom Standort und den klimatischen Bedingungen des Jahres variieren.

① Saatgut beschränkt verfügbar

*kann im Herbst ausgesät werden

Legend:

+++ = sehr gut
 ++ = gut
 + = mittel bis gut
 ∅ = mittel

- = mittel bis schwach
 -- = schwach
 --- = sehr schwach

Tausendkorngewicht:
 Frühreife:
 Pflanzenlänge:

k = klein ; m = mittel; g = gross
 sf = sehr früh; f = früh; mf = mittelfrüh; ms = mittelfspät;
 s = spät; sk = sehr kurz; k = kurz; mk = mittel bis kurz;
 m = mittel; ml = mittel bis lang; l = lang; sl = sehr lang