

TITLIS

Blé d'automne classe Top

Culture et indications sur la variété

Type de variété	type peuplement	
Facteurs de rendement		
• Peuplement optimal épis/m ²	++	fort
• Nombre de grains/épi	+	moyen à fort
• PMG	++	fort
Tallage	moyen à faible	
Rendement grains		
• PER	--	
• Extenso	--	
Culture Extenso	convient bien	
Epoque / densité de semis grains/m²		
• précoce	325-375	
• optimale	375-425	
• tardive	450-500	
Semis tardifs	conviennent bien	
Résistance à l'hiver	++	
Maturité	mi-tardive	
Hauteur	moyenne à longue	
Résistance à la verse	++	
Risque de germination	+	
Résistance aux maladies		
• Oïdium	+	
• Rouille brune	++	
• Septoriose feuilles	∅	
• Septoriose épis	∅	
• Septoria tritici	+	
• Fusariose	+	

Fumure azotée

→ **Règle générale:** La fumure N devrait être adaptée aux réserves du sol, à l'emplacement, au rendement visé et aux conditions météorologiques.

Type peuplement

La fumure N de départ doit absolument être adaptée au développement du peuplement ! Les types peuplement réagissent à une densité trop forte au début de la montaison par une réduction des épis inférieurs. Par un 3^e apport, assurer la formation des graines dans l'étendard (PMG).

Régulateur de croissance (en culture intensive)

- Dosage **faible** (réagit mal aux régulateurs de croissance)