

TOMMI

Blé d'automne classe II

Culture et indications sur la variété

Type de variété	type épi principal	
Facteurs de rendement		
• Optimal épis/m ²	–	moyen à faible
• Nombre de grains/épi	+ + +	très fort
• PMG	∅	moyen
Tallage	moyen	
Rendement grains		
• PER	+ + (+)	
• Extenso	+ +	
Culture Extenso	convient bien	
Epoque / densité de semis grains/m²		
• précoce	250-300	
• optimale	300-350	
• tardive	350-400	
Semis tardifs	-	
Résistance à l'hiver	∅	
Maturité	mi-tardive	
Hauteur	courte	
Résistance à la verse	+ +	
Risque de germination	+	
Résistance aux maladies		
• Oïdium	+	
• Rouille brune	∅	
• Septoriose feuilles	∅	
• Septoriose épis	+	
• Septoria tritici	∅	
• Fusariose	∅	

Fumure azotée

→ **Règle générale:** La fumure N devrait être adaptée aux réserves du sol, à l'emplacement, au rendement visé et aux conditions météorologiques.

Type épi principal

Fumure modérée à époque de semis précoce à normale. Avec la fumure à la montaison, la tige principale et 1 à 2 tiges secondaires sont favorisées. Un apport élevé au stade feuille étendard garantit la formation des grains.

Régulateur de croissance (en culture intensive)

- Dosage moyen