

Blé fourrager

Blé fourrager	Rendement Extenso	Rendement PER	Maturité	Densité de semis		Facteurs de rdt.**			Résistance aux maladies								
				semis précoce grains /m ²	semis tardif grains /m ²	peuplement optimal /m ²	nombre de grains par épi	PMG	Verse	germination sur pied	hiver-nage	Oïdium	Rouille brune	Septoriose feuilles	Septoriose épis	Septoria tritici	Fusariose
Tapidor	++++	++++	mi-précoce	250-300	400-450	∅	++	∅	++	--	--	∅	∅	∅	-	∅	--
Rustic	++	++	mi-précoce	300-350	400-450	++		∅	+	++	++	++	∅	+	-	∅	+
Mulan	++++	+++	mi-précoce	275-325	400-450	+	∅	∅	+++	--	++	+	+	∅	∅	∅	∅
Winnetou	++++	+++	mi-tardive	275-325	400-475	+	++	∅	+	+	+	∅	∅	+	+	∅	-

Appréciation: ++++ excellent +++ très bon ++ bon + moyen à bon ∅ moyen - moyen à faible -- faible --- très faible

** Importance des facteurs de rendement +++ très forte ++ forte + assez forte ∅ moyenne - moyenne à faible