

WINNETOU

Futterweizen

Anbau- und Sortenhinweise

Sortentyp	Kompensations-Typ
Ertragsfaktoren	
• Zielbestand Ähren/m ²	+ mittel bis hoch
• Kornzahl/Ähre	++ hoch
• TKG	∅ mittel bis hoch
Bestockung	∅
Körnerertrag	
• ÖLN	++++
• Extenso	+++
Extenso – Anbau	nicht geeignet
Saatzeit / Saatlänge Körner/m²	
• Früh	275-325
• Optimal	325-375
• Spät	400-475
Spätsaateneignung	--
Winterhärte	+
Reife bei der Ernte	mittelspät
Pflanzenlänge	mittel
Standfestigkeit	+
Auswuchsresistenz	+
Krankheitsresistenzen	
• Mehltau	∅
• Braunrost	∅
• Spelzenbräune Blatt	+
• Spelzenbräune Ähre	+
• Septoria tritici	∅
• Fusarien	-

Stickstoffdüngung

→ **Grundsätzlich gilt:** Die N-Düngung sollte an Bodenvorräte, Standort, Ertragsziel und den Witterungsverhältnissen angepasst werden.

Komp.-Typ

Die Startdüngung hängt von der Bestandesentwicklung im Frühjahr ab. Die 2. Gabe sollte in gut bestockte Bestände nicht zu früh erfolgen. Vor allem bei Sorten mit hoher Kornzahl/Ähre. Mit der 3. Gabe das TKG absichern.

Wachstumsregulator (im Intensivanbau)

- Aufwandmenge hoch

++++ ausgezeichnet +++ sehr gut ++ gut + mittel bis gut
 ∅ mittel - mittel bis schwach -- schwach --- sehr schwach